

Biodiversiteit beheermaatregelen

Verbeteren bodemkwaliteit

- 1 à 2x per jaar maaien
 - Resulteert in verschraling
- Afvoeren van maaisel
- Gebruik kleine machines



- + Creëert hogere kruidenrijkdom
- + Vermijdt beschadiging van grondnesten van insecten

Creëren vegetatie eilanden

- Aanleggen van eilanden met diverse soorten struikgewas en kruidensoorten in grasland



- + Voorzien van beschutting, voedsel en corridors voor fauna
- + Verbindingszone

Maaien met beleid

- Gefaseerd maaien
- Maai laat in het najaar



- + Creëert voedselvoorziening, schuil- en nestelplekken, voor broedvogels en ongewervelden
- + Bevordert zaadzetting van vegetatie

Variatie in bloeitijd

- Mix van vroeg- en laatbloeiende soorten
- Stimuleren inheemse soorten en vermijd invasieve exoten



- + Voldoende voedselvoorziening voor bestuivers gedurende gehele seizoen

Creëren microhabitats

- Aanleggen van stapelmuren en takkenrillen
 - Gebruik maken van oude stenen, hout en leem
- Bouwen van hoorruiters



- + Creëert schuil- en nestelplekken voor fauna

Wilde bestuivers

- Advies om max. 1 honingbijenkast per km² te plaatsen
 - Competitie om beschikbare stuifmeel en nectar tussen honingbijen en wilde bestuivers
- Focus op wijd bloeiseizoen



- + Creëert meer biodiversiteit

Dood hout


- Laat oude, zieke en dode bomen ongemoeid



- + Creëert voedselvoorziening, schuil- en nestelplekken voor insecten, geleedpotigen en schimmels met positief effect op gehele voedselweb

Creëren van zoomvegetatie

- Graduele overgang tussen open veld en bos: struiken aanplanten
- Aanleggen van struwelen
- Bosranden met enkele inhammen



- + Microklimaat positief effect op biodiversiteit

